

.Extraccion Consentimiento

First Name - Patient

Last Name - Patient

Patient Date of Birth

Dentista que Asiste: Dr. Lago



Formulario de Consentimiento para Extracción de Dientes

Dientes

Precio

La extracción de los dientes es un proceso irreversible y ya sea de rutina o difícil es un procedimiento quirúrgico. Como en cualquier cirugía, existen algunos riesgos. Incluyen, pero no están limitados a:

1. Hinchazón o moretones y malestar en el área de la cirugía.
2. Estiramiento de las esquinas de la boca que resulta en grietas y hematomas.
3. Posible infección que requiere tratamiento adicional.
4. Alveolitis seca: dolor en el lugar de la extraccion que comienza unos días después de la cirugía y que generalmente requiere atención adicional; es más común en las extracciones inferiores, especialmente en las muelas del juicio.
5. Posible daño a los dientes adyacentes, especialmente aquellos con grandes empastes o coronas.
6. Entumecimiento o sedación alterada en los dientes, los labios, la lengua y el mentón, debido a la cercanía de las raíces de los dientes (especialmente las muelas del juicio) a los nervios que pueden estar magullados o lesionados. La sensación más a menudo vuelve a la normalidad, pero en casos raros, la pérdida puede ser permanente.
7. Trismo: limitación de la apertura de la mandíbula debido a inflamación o hinchazón, más común después de la extracción de la muela del juicio. Algunas veces es el resultado de la incomodidad de la articulación de la mandíbula (TMJ, por sus siglas en inglés), especialmente cuando la enfermedad y los síntomas de la ATM ya existen.
8. Sangrado: el sangrado significativo no es común, pero puede esperarse exudado persistente durante varias horas.
9. Las crestas agudas o astillas de hueso pueden formarse más tarde en el sitio de la extraccion. Estos pueden requerir otra cirugía para alisarlos o eliminarlos.
10. Eliminación incompleta de fragmentos de dientes: para evitar daños a estructuras vitales como nervios o senos nasales, a veces se pueden dejar pequeñas puntas de raíz en su lugar. Implicación de los senos nasales: las raíces de los dientes superiores superiores a menudo se encuentran cerca del seno y algunas veces un trozo de raíz se puede desplazar hacia el seno, o puede haber una abertura en la boca que puede requerir cuidados adicionales.
11. Fractura de mandíbula: aunque es poco común, es posible en dientes difíciles o profundamente impactados.

Consentimiento informado: Aceptó voluntariamente todos los riesgos posibles, incluido el riesgo de daño sustancial, si corresponde, que pueda estar asociado con cualquier fase de este tratamiento con la esperanza de obtener el resultado deseado. Al firmar este documento, autorizo a Dr. Lago a realizar la extracción de dientes en mi boca y, además, autorizo al Dr. Lago y / oa sus asociados a prestar los servicios que se consideren necesarios o aconsejables en el tratamiento de mi afección dental, incluida la prescripción y administración de cualquier agente anestésico y / o medicamento médicamente necesarios

He leído y entiendo lo anterior, y me han respondido mis preguntas. Reconozco que no puede haber garantía en cuanto al resultado del tratamiento y doy mi consentimiento para la cirugía.

Print name

Signature

Clear